PREVALIN™

Cliniquement testé – Protection contre le Rhume des Foins et les Rhinites Allergiques

Prevalin™ est un spray composé d'ingrédients naturels qui protège contre les allergènes responsables du rhume des foins et des rhinites allergiques. **Prevalin™** utilise une technologie unique et brevetée appelée *NASYA™*. Grâce à sa combinaison d'huiles et d'émulsifiants, sa formule a des propriétés de transformation uniques : le gel devient liquide au moment de la pulvérisation pour retrouver sa consistance solide une fois au contact des muqueuses, formant ainsi un film protégeant des allergènes.
Il est recommandé d'utiliser **Prevalin™** en prévention de la rhinite allergique pour empêcher les allergènes d'atteindre les muqueuses nasales et réduire les symptômes tels que les éternuements, la congestion, l'écoulement ou l'irritation nasale. Si la réaction allergique est déjà déclenchée, **Prevalin™** peut également venir en complément d'un traitement pour éviter toutes expositions supplémentaires aux allergènes.

Dispositif Médical de Classe I

Prevalin™ est un traitement local. Sa sécurité et son efficacité sont testées séparément et cliniquement. Sa formule brevetée ne contient pas de conservateur, ni d'alcool, ni de parfum.

Ingrédients:

Bentonite, gomme xanthane, huile de sésame, huile de menthe verte, eau et excipients stabilisateurs

Mode d'emploi:



Étape 1
Avant d'utiliser **Prevalin™**, agitez le flacon énergiquement au moins **quatre fois**, en le maintenant en position verticale, sans enlever le bouchon.

Étape 2
Placez le flacon « tête en bas » et agitez-le à nouveau au moins **quatre fois**, en maintenant toujours le bouchon à sa place.

Étape 3
Retirez le bouchon du flacon.

Étape 4
Amorcez la pompe avant la première utilisation : pressez l'applicateur vers le bas durant 5 à 10 secondes, puis lâchez-le. Répétez jusqu'à obtenir une pulvérisation complète.

Étape 5
Mouchez-vous ou nettoyez votre nez soigneusement avant chaque application.

Étape 6
Appuyez légèrement sur l'une de vos narines. Tenez le flacon bien droit et insérez entièrement son embout dans l'autre narine. Pendant que votre pouce retient le bas du flacon, appuyez avec deux doigts sur l'applicateur, puis relâchez.

Étape 7
Inclinez quelques instants votre tête vers l'arrière, après application, et respirez normalement par le nez.

Étape 8
Répétez l'étape 6 et 7 avec l'autre narine. Replacez le bouchon après usage.

- Effectuez une à deux pulvérisations dans chaque narine, deux à trois fois par jour (pour 4 à 6 heures de protection).

Prevalin™ peut être utilisé comme **protection naturelle** ou en **association à un traitement pendant et après** le déclenchement de la rhinite allergique.

Précautions d'utilisation:

- Aucun effet secondaire lié au traitement de **Prevalin™** n'a été constaté. Ses ingrédients sont neutres, non toxiques et couramment utilisés dans les préparations alimentaires et pharmaceutiques.
- **Prevalin™** ne provoque pas de somnolence et est recommandé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans.
- Pour les enfants de moins de 12 ans, il est recommandé d'utiliser **Prevalin™ Kids** sous la surveillance d'un adulte.
- **Prevalin™** ne présente aucune contre-indication connue liée à des interactions avec d'autres médicaments ou d'autres formes de traitements antihistaminiques. L'application de **Prevalin™** ne nuit pas à l'efficacité de ces traitements.
- Si un autre spray nasal est utilisé, **Prevalin™** doit être appliqué après, pour favoriser la formation d'un film protecteur imperméable et efficace sur les muqueuses.
- Durant une heure, après la première utilisation, vous pouvez sentir votre nez légèrement bouché. Cette sensation doit rapidement s'estomper et disparaître progressivement lors des applications suivantes.
- Si les parois de vos muqueuses sont sensibles, vous pouvez ressentir une impression d'irritation lors de la première application de **Prevalin™**, qui doit rapidement s'atténuer.
- Si vous éprouvez une sensation d'inconfort importante après l'application de **Prevalin™**, cessez aussitôt son utilisation et consultez votre médecin.

Mises en garde:

- Utiliser uniquement dans la cavité nasale.
- Ne pas appliquer sur une plaie.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans un milieu sec, à température ambiante (une température trop basse peut altérer la formation de gouttelettes et de spray).
- Prevalin peut s'utiliser pendant 90 jours après ouverture du spray.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.

CE

Fabricant:
InQpharm Europe Ltd.
Waldseeweg 6
13467 Berlin
Germany

Distributeur:
Laboratoires Omega Pharma France
BP 80
FR-92 Châtillon

Prevalin et Omega Pharma sont enregistrés comme marques d'Omega Pharma NV.
InQpharm et Nasya sont des marques appartenant à InQpharm Europe Ltd, Berlin, Allemagne

www.prevalin.com

MPA/PI/FR/001
Dernière revision : Janvier 2010

20ml, 140 doses